


SKRIPSI

LALAT SBG. PEMBAWA PENYAKIT

**IDENTIFIKASI LALAT PADA KERBAU DAN SAPI POTONG
DI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN BOJONEGORO
JAWA TIMUR**



SITI RATNA WISMANINGSIH
BOJONEGORO - JAWA TIMUR

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1991**

**IDENTIFIKASI LALAT PADA KERBAU DAN SAPI POTONG
DI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN
BOJONEGORO - JAWA TIMUR**

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Dokter Hewan :
pada
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga**




Konisi Pembimbing



Made Natawidjaja, MSc., Drh.

Pembimbing Pertama




Husni Anwar, Drh.

Pembimbing Kedua

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh,
kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun
kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh
gelar DOKTER HEWAN.

Menyetujui
Panitia penguji




(Mustahdi Surjoatmodjo, M.Sc., Drh.)

Ketua



(Titi Hartati, S.U., Drh.)



(Kusrinigrum Rachiman, M.S., Ir.)

Sekretaris

Anggota



(Made Natawidjaja, M.Sc., Drh.)



(Husni Anwar, Drh.)

Anggota


Anggota

Surabaya, 7 September 1991

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga

Dekan,



(Prof. Dr. Soehartojo Hardjopranjoto, M.Sc.)

**IDENTIFIKASI LALAT PADA KERBAU DAN SAPI POTONG
DI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN
BOJONEGORO - JAWA TIMUR**

Siti Ratna Wismaningsih

INTISARI

Pengamatan jenis lalat pada peternakan kerbau dan sapi potong dilakukan di kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro pada bulan Maret 1991. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis lalat yang ada. Lalat di tangkap dengan menggunakan jaring penangkap lalat, kemudian di bunuh dengan menggunakan ether dan diawetkan dengan alkohol 70% dalam pot plastik.

Pada satu kecamatan diambil contoh 75 kandang kerbau dan 75 kandang sapi potong. Ada tidaknya jenis lalat dinyatakan dengan positif atau negatif dan pengolahan data dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji chi square.

Jenis lalat yang ditemukan antara lain: Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, Musca domestica, Musca autumnalis, Tabanus rubidus dan Tabanus megalops.

Uji χ^2 membuktikan, bahwa tidak ada perbedaan ($p > 0,05$) jenis-jenis lalat pada kerbau dan sapi potong dalam kandang di wilayah kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro.